



Academia POCUS CR ***SONO-SEMIOTOLÒGIA*** ***PULMONAR***



Dr
Joshua Granados


ESPECIALISTA MEDICINA INTERNA

POSICIÓN DEL TRANSDUCTOR



Un examen pulmonar estándar en el lugar de atención implica la evaluación de tres posiciones de ultrasonido específicas para cada pulmón con el transductor de ultrasonido en orientación longitudinal:


PROTOCOLO BLUE



POSICIÓN DEL TRANSDUCTOR




- 1) El 1.er punto BLUE: se encuentra en la pared torácica anterior, justo debajo de la clavícula (2.º-3.er espacio intercostal) y en la línea medioclavicular.



POSICIÓN DEL TRANSDUCTOR




- 1) El 1.er punto BLUE: se encuentra en la pared torácica anterior, justo debajo de la clavícula (2.º-3.er espacio intercostal) y en la línea medioclavicular.



POSICIÓN DEL TRANSDUCTOR




2) El segundo punto BLUE está ubicado en la pared anterolateral del tórax, justo lateral al pezón (cuarto espacio intercostal) y en algún lugar entre la línea axilar anterior y la línea axilar media.



PUNTO PLAPS



3) El punto PLAPS (Síndrome Alveolar Posterior y/o Lateral y/o Pleural):
Continúe deslizando el transductor desde el segundo punto lo más posterior posible. Mantenga el transductor perpendicular y posterior a la línea axilar posterior para obtener imágenes del tejido pulmonar justo encima del diafragma.



PUNTO PLAPS




Evalúa los lóbulos inferiores de los pulmones y es la mejor posición para buscar consolidaciones pulmonares y derrames pleurales.

Al escanear pulmones sanos, el "signo de la cortina" está presente al nivel del punto PLAPS.


El signo de la cortina ocurre cuando las imágenes de los órganos debajo del diafragma se ven afectadas por la variación respiratoria o los pulmones aireados.



PUNTOS BLUE



PUNTOS BLUE



PUNTOS BLUE

